




Effekttabel ukrudtsmidler i sukkerroer (opdateret 04/4 2024)

			Phen- medipham	Metamitron	Etho- fumesat	Triflu-sulfuron	Clomazon	Clopyralid
		Hunde- persille						
		Mælde						
		Spildraps						
		Burre-snerre						
		Vejpileurt						
		Ferskenbl. Pileurt						
		Snerle-pileurt						
		Fuglegræs						
		Sort natskygge						
		Ager-sennep						
		Stedmoder						
		Kamille						
		Hejrenæb						
		Ærenpris						
		Hanekro						
		Svinemælk						
		Kiddike						
		Forglem- migej						
		Læge Jordrøg						

Forklaring	Effekt:	Meget god	God	Nogenlunde	Lav	
------------	---------	-----------	-----	------------	-----	--

Effekttabel græsmidler i sukkerroer

	Agil	Focus Ultra
Ager rævehale (ikke resistent)		
Alm Rapgræs		
Enårig rapgræs		
Flyvehavre		
Hejre		
Kvik		
Rajgræs (ikke resistent)		
Spildkorn		
Vindaks		
Væselhale		

Midler mod græsukrudt

	Propaquizafob	Cycloxydim
Handelsnavne	Agil 100 EC Zetrola	Focus Ultra LFS Cycloxydim
Min. timer uden regn	0,5	0,5
Max dosering	0,8 l	5 l
Max antal beh.	2	1
Optimal temp.	10-24 °C	10-24 °C

Midler mod bredbladet ukrudt

	Phenmedipham	Metamitron	Ethofumesat	Triflusalufuron	Clomazon	Clopyralid
Handelsnavne	Betanal Betasana 160 SE SweDane Betasana 16 SE Kontakt 320 SC	Goltix SC 700 Metafol 700 ECP Metafol 700 SE Mitron 700 SC Target 700 Target 70 SE UPL Metafol	Nortron SC	Safari 50 WG	Centium 36 CS* Clomate Kalif 360 SC Reactor 360 SC	Cliopar 600 * Matrigon 72 **
Min. timer uden regn	2		1	1	*) også efter fremspinq	6
Max dosering	960 g aktivt stof	3 l	0,23 l pr. beh.	15 g	0,2	0,040 l * 0,035 g **
Max antal beh.	4	3-4	3		4	
Optimal temp.	15-20 °C	15 °C	15-20 °C	12-24 °C		Over 15 °C

Insektmidler

	Lambdacyhalothrin	Pirimicarb	Flonicamid
Handelsnavne	Lamdex	LFS Pirimicarb Pirimor 500 WG	Teppeki
Min. timer uden regn	1	1	1
Max dosering	0,3 l	0,280 kgl	0,140 kg
Max antal beh.	3	1	1
Optimal temp.	10-20 °C	Lunt og stille vejr	Ikke afgørende